



DAP De Varing

Dierenarts Vanessa Meganck

Varingstraat 22A

9506 Smeerebbe-Vloerzegem

0498 61 12 42

Enkele belangrijke ziekten bij schapen en hun preventie/behandeling samen met een paar basistips:

- **WORMEN**

- Er zijn drie groepen wormen die schade kunnen berokkenen: de rondwormen (nematoden), de platwormen (trematoden) en de lintwormen (cestoden). Bij de rondwormen worden vier soorten onderscheiden: de *Haemonchus contortus* of rode legbmaagworm, de *Nematodirus battus*, *Teledorsagia circumcincta* en *Trichostrongylus*.
- De platworm leverbot (*Fasciola hepatica*) → opgelet, de meeste courante ontwormingsmiddelen werken hier niet tegen! Risicoweiden zijn natte weiden.

- **COCCIDIOSE**

- Geeft diarree (met eventueel bloed erin), lammetjes die staan te persen
- Wanneer toedienen?
  - Bij problemen
  - Indien voorgeschiedenis van problemen: lammetjes preventief op 6-8 weken behandelen en moederdieren mee behandelen
- Producten die werken tegen coccidiose:
  - Vecoxan: 4 ml per 10 kg in de mond
  - Baycox: 4 ml per 10 kg in de mond

- **ENTEROTOXEMIE**

- Meest typisch: schapen/lammetjes die plots dood liggen, dikwijls met opgeblazen lijf. Zijn meestal de best groeiende dieren die meest eten, vandaar ook de 'weeldeziekte' genoemd.
  - Behandeling komt meestal te laat
  - Preventie:
    - Vaccineren met covexin of miloxan
      - Covexin 2 x 1 ml tussen vel en vlees met 4 weken tussen als eerste vaccinatie, daarna jaarlijks herhalen. Kan vanaf 8 weken leeftijd (of 2 weken leeftijd als om één of andere reden gedacht wordt dat biestvoorziening slecht was).
      - Miloxan 2 x 2 ml tussen vel en vlees met 4 weken tussen als eerste vaccinatie, daarna jaarlijks herhalen. Kan vanaf 8 weken leeftijd (of 2 weken leeftijd als om één of andere reden gedacht wordt dat biestvoorziening slecht was).
- 
- TETANOS
    - Ook wel 'de klem' genoemd. Typisch symptoom: schapen die plots 'stijf' zijn.
    - Behandeling komt meestal te laat
    - Preventie
      - Vaccineren met covexin of miloxan idem als bij enterotoxemie
- 
- ROTKREUPEL
    - Dit is een zeer besmettelijke en uiterst pijnlijke ontsteking van de tussenkluwhuid bij schapen. Ze wordt veroorzaakt door de samenwerking tussen 2 bacteriën: *Fusobacterium necrophorum* en *Dichelobacter nodosus*. Door de pijn aan de klauwen gaan de schapen kreupel lopen en zullen ze grazen op de knieën omdat rechtstaan te pijnlijk wordt. Zelfs als er geen klinische symptomen zichtbaar zijn, kan de *D. nodosus* bacterie aanwezig zijn bij dragers van de kiem en vroeg of laat, onder de juiste omstandigheden voor de bacterie, problemen veroorzaken. Behandeling is met antibiotica en pijnstilling, aan de klauwen zelf wordt best pas gewerkt na genezen van de ontsteking.



- VOEDING

- Gras, hooi en water moet het basisvoedsel zijn.
- Af en toe een stukje gedroogd brood of wat schapenkorrels (let op: geen geitenkorrel!) kan zeker, om de schaapjes tam te houden en voor wat aanbreng van extra vitaminen en mineralen.
- Te veel brood, korrels (kippenvoer!!), ... kan leiden tot gezwollen buikjes (maag vol gas). Dit is pijnlijk en kan in extreme gevallen dodelijk aflopen. Let dus bv zeker op als je ook kippen hebt en het voer voor de kippen staat binnen bereik van de schaapjes. Let ook op als voorbijgangers of buren de schaapjes (kunnen) voeren. De gegeven hoeveelheid brood kan dan snel (gevaarlijk) hoog oplopen. Vraag de mensen vriendelijk maar kordaat om dit niet te doen.

- LAMMERTIJD

- Bel de dierenarts als:
  - Er een uur na het 'breken van het water' nog geen lammetje geboren is.
  - Het schaap aanhoudend perst en je ziet niks verschijnen of opschuiven.
  - De lammetjes niet onmiddellijk na de geboorte beginnen te mekkeren.
  - De lammetjes niet binnen het uur na de geboorte gaan drinken. Beste is zelfs om pasgeboren lammetjes aan de tepel te zetten of de eerste melk met een flesje te geven. De eerste melk is de biest, vol levensnoodzakelijke antistoffen voor een goede afweer.
  - De lammetjes koud aanvoelen of weinig bewegen.

- KLAUWVERZORGING

- Afhankelijk van schaap tot schaap, maar 2x/jaar is een minimum.

- GIFTIGE PLANTEN



- Schapen zijn meesters in het ontsnappen en opeten van alles wat ze niet moeten opeten. Let vooral op als er taxus, rhododendron of laurierkers in de buurt staat!
  
- **ALGEMEEN**
  - Is er een schaapje wat trager, eet het wat slechter, ... aarzel niet om je dierenarts te bellen. Schapen zijn prooidieren dus zullen pas laten zien dat ze ziek zijn als het al vrij erg is.

Succes!

Dierenarts Vanessa

